



Angående doseringsfrekvens av teclistamab i Norge

Doseringsfrekvensen av teclistamab (Tecvayli) i SMPC er høyere enn det som per i dag anses som optimalt. Årsaken til dette er at for hyppig administrering leder til utslitte («exhausted») T-celler, og gjør at man mister eHekten raskere, i tillegg til økt risiko for andre infeksjoner. Nyere studier har derfor en annen administrering enn det som er i SMPC, hvor man går raskt ned til månedlige doser. Andre land, som Tyskland, som har brukt medikamentet i lengre tid, har også redusert frekvensen til lavere enn det man ser i SMPC.

Vi i den norske handlingsprogramkomitéen har diskutert dette, og kommet frem til hvilken dosering vi kommer til å anbefale i neste versjon av handlingsprogrammet. Hvis teclistamab blir tilgjengelig på det norske markedet er det dette regimet vi vil formidle til norske hematologer. Alle nye pasienter som kommer til å starte på dette medikamentet, vil nok de første gangene konsultere de større sykehusene, representert i denne komitéen. Denne doseringen vil også være den som ligger i CMS.

Doseringen vi vil anbefale:

1. syklus (28 dager): Step-up-doser første uken, og deretter ukentlig. 1,5mg/kg
2. syklus (28 dager): Hver 14.dag. 1,5mg/kg
3. syklus og videre: Hver 28.dag. 3mg/kg

Mvh

Handlingsprogramkomitéen for myelomatose; 12.Februar 2024

På vegne av Norsk selskap for hematologi

Fredrik Schjesvold

Fredrik Schjesvold (Mar 7, 2024 10:00 GMT+1)

Fredrik Schjesvold

Tobias Slørdahl

Øyvind Hjertner (Mar 7, 2024 11:07 GMT+1)

Øyvind Hjertner

Nina Gulbrandsen

Nina Gulbrandsen (Mar 7, 2024 14:06 GMT+1)

Nina Gulbrandsen

Einar Haukås

Einar Haukås (Mar 10, 2024 22:34 GMT+1)

Einar Haukås

Galina Tsykunova

Jürgen Rolke

Jürgen Rolke (Mar 9, 2024 09:36 GMT+1)

Jürgen Rolke