



	<p>forhøyede eosinofiler i blodet, med en kombinasjon av ICS, LABA og LAMA.</p> <p><b>I:</b> Mepolizumab brukt i tråd med anbefalt dosering i preparatomtalen: 100 mg hver 4. uke.</p> <p><b>C:</b> Dagens standardbehandling: Kombinasjonen ICS, LABA og LAMA.</p> <p><b>O:</b> Lungefunksjon, eksaserbasjoner, overlevelse, helserelatert livskvalitet og ressursbruk.</p>
<b>Vurdering fra Direktoratet for medisinske produkter</b>	Det foreligger en metodevurdering av dupilumab for tilsvarende indikasjon (ID2024_046). Det er foreløpig ikke fattet beslutning i Nye metoder i denne saken.
<b>Anbefaling fra Direktoratet for medisinske produkter (knyttet til metodevurdering)</b>	DMP vurderer at det er nødvendig å vurdere om prioriteringskriteriene er oppfylt ved anmodet bruk. Det foreligger data som kan være egnet for en metodevurdering med en helseøkonomisk analyse (kostnad-per-QALY-analyse).

## Versjonslogg\*

Dato	Hva
03.03.2026	Egnethetsvurdering ferdigstilt hos DMP

\*Egnethetsvurderinger oppdateres ikke regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se [Legemiddelsøk.no](https://legemiddelsøk.no). Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler.