



## Solriamfetol mot uttalt søvnighet ved narkolepsi og obstruktiv søvnnapné

Type metode: Legemiddel

Område: Nevrologi

Virkestoffnavn: solriamfetol

Handelsnavn:

ATC-kode: N07

MT søker/innehaver: Jazz Pharmaceuticals

Finansieringsansvar: Spesialisthelsetjenesten

### Status for bruk og godkjenning

Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:



Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har MT i Norge (8), EU og USA (1).

### Beskrivelse av den nye metoden

Solriamfetol er en selektiv dopamin og noradrenalin reopptaks-hemmer som administreres per oralt.

### Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag

Obstruktiv søvnnapné er en sykdom der trang passasje og kollaps av bløtevær i luftveiene som under søvn gir snorking og gjentatte pustestopp. Sykdommen gir bla. uttalt trethet og slitenhet på dagtid. Pasientene er også mer disponert for hjerte-kar sykdom. Det antas at ca. 1/6 voksne nordmenn har obstruktiv søvnnapné. (2)

Narkolepsi er en sjeldent nevrologisk søvnsykdom. Prevalensen er 0,02-0,05 % og man antar det er mellom 1000-2500 pasienter i Norge. Narkolepsi gir ekstrem søvnighet på dagtid med gradvis eller akutte søvnanfall. Mange har også katapleksi, som er forbigående bortfall av aktivitet i voluntær muskelaktivitet, gjerne utløst av følelser (f.eks. latter).

Søvnparalyser, hypnagogic hallusinasjoner (sanseopplevelser i fase mellom våkenhet og søvn) og forstyrret søvnaktivitet er andre plager forbundet ved narkolepsi. (3)

### Dagens behandling

Behandlingsalternativene ved obstruktiv søvnnapné består av livsstilsendringer, apnéskinne, CPAP eller kirurgi (i sveig/gane) (2).

Narkolepsi behandles medikamentelt med sikte på å redusere symptomer som søvnighet, katapleksi, hallusinasjoner og søvnparalyse, samt bedre søvnkvaliteten. Sentralstimulantia som metylfenidat, modafenil eller natriumoksybat benyttes til å øke våkenhet. Trisykliske antidepressiva som klomipramin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) som fluoksetin, paroksetin, samt selektive serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) benyttes for å bedre symptomer som katapleksi, hallusinasjoner og søvnparalyse. Søvnhygiene, livsførel og tilrettelegging er også en del av behandlingen, og natriumoksybat, kortidsvirkende benzodiazepiner eller melatonin brukes for å bedre nattlig søvnkvalitet (3,4).

### Status for dokumentasjon

#### Metodevurderinger eller systematiske oversikter -norske

- Ingen relevante identifisert

#### Metodevurderinger eller systematiske oversikter -internasjonale

- Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (5-7)

#### Metodevarsler

- Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsle (1)

#### Klinisk forskning

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Statens legemiddelverk har ansvar for innholdet i metodevarsler om legemidler som fremstiller et overordnet bilde av det kommende legemidlet på et tidlig tidspunkt. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringssplattform for metodevarsler. For mer informasjon om metodevarsler, se [Om MedNytt](#).

De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:

Populasjon (N =antall deltagere)	Intervensjon	Kontrollgruppe	Utfallsmål	Studienavn og nummer* (fase)	Tidsperspektiv resultater
Voksne pasienter med obstruktiv søvapné (N=476)	Solriamfetol p.o 37,5, 75, 150 og 300 mg + placebo (5 armer)	-	Maintenance of Wakefulness Test (MWT) og Epworth Sleepiness Scale (ESS) fra baseline til 12 uker	<a href="#">NCT02348606</a> . Fase 3.	Ferdig. <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC30521757/?page=Abstract">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC30521757/?page=Abstract</a>
Voksne pasienter med narkolepsi (N=239)	Solriamfetol p.o. 75, 150 og 300 mg + placebo (4 armer)	-	Maintenance of Wakefulness Test (MWT) og Epworth Sleepiness Scale (ESS) fra baseline til 12 uker	<a href="#">NCT02348593</a> . Fase 3.	Ferdig, men under QC. <a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02348593">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02348593</a>
Voksne pasienter med OSA eller narkolepsi (N=645)	Solriamfetol p.o. 75-300 mg x 1	-	Antall pasienter med bivirkninger	<a href="#">NCT02348632</a>	Ferdig, men under QC. <a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02348632">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02348632</a>

\*ClinicalTrials.gov Identifier [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov)

#### Relevante vurderingselementer for en metodevurdering

- Klinisk effekt relativt til komparator
- Sikkerhet relativt til komparator
- Kostnader/ressursbruk
- Kostnadseffektivitet
- Organisatoriske konsekvenser
- Etikk
- Juridiske konsekvenser
- Annet

#### Hva slags metodevurdering kan være aktuell

- |                             |                                     |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| Hurtig metodevurdering      | <input checked="" type="checkbox"/> | Legemiddelverket foreslår kostnad-nytte analyse |
| Fullstendig metodevurdering | <input type="checkbox"/>            |   |

## Hovedkilder til informasjon

1. Solriamfetol. (26. mars 2019). Specialist Pharmacy Service, NHS. Hentet 15. april 2019, fra <https://www.sps.nhs.uk/medicines/izp-110/>
2. Snorking og sovnnapné. Oslo universitetssykehus. <https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/snorking-og-sovnnapn#les-mer-om-cpap-behandling>
3. Narkolepsi. Oslo universitetssykehus. <https://oslo-universitetssykehus.no/faq-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nevsom/narkolepsi>
4. Narkolepsi, Norsk Legemiddelhåndbok; Hentet 04.06.19 fra: <https://www.legemiddelhandboka.no/legacy/chapter/T6.8.1>
5. Abad VC, et al. (2018). *Solriamfetol for the treatment of daytime sleepiness in obstructive sleep apnea*. *Expert Rev Respir Med.* doi: 10.1080/17476348.2018.1541742.
6. De Biase S, et al. (2017). *Investigational therapies for the treatment of narcolepsy*. *Expert Opin Investig Drugs.* 26(8), 953-963.
7. *Solriamfetol for treating excessive sleepiness caused by narcolepsy or obstructive sleep apnoea [ID1499]*. (2018). (Proposed [GID-TA10430]). London: National Institute for Health and Care Excellence. Hentet 15. April 2019, fra <https://www.nice.org.uk/guidance/proposed/gid-ta10430/documents>
8. Sunosi, Legemiddelvisning; Hentet 19.05.2020 fra: <https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=893082fc-7ba6-464d-b351-293cd845874a&searchquery=solriamfetol&f=Han;Mtl;Vir;ATC;Var;Ikk;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0>

Dato for første publisering

21.06.2019

Siste oppdatering

22.05.2020