

Notat

Til:

Helse Nord RHF	Fagdirektør	Per Rønning
Helse Vest RHF	Fagdirektør	Bjørn Egil Vikse
Helse Sør-Øst RHF	Fagdirektør	Ulrich Spreng
Helse Midt-Norge RHF	Fagdirektør	Trude Basso

Kopi: Sekretariat for Nye metoder

Fra: Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Dato: 04. august 2026

ID2026_027: Hydrokortison (Efmody) til behandling av binyrebarkinsuffisiens hos ungdom ≥ 12 år og voksne

Bakgrunn

Det vises til møte i Bestillerforum 15.06.2026 der følgende oppdrag ble bestilt:

Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF.

Det vises dessuten til anmodning fra leverandør (19.05.2026).

Indikasjonsutvidelsen ble godkjent i EMA 13.03.2026.

Godkjent indikasjon:

Efmody er indisert hos ungdom i alderen 12 år og eldre og voksne til:

- *Behandling av binyrebarkinsuffisiens¹*

Efmody har tidligere blitt innført til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi hos ungdom ≥ 12 år og voksne (ID2021_072, 21.03.2022).

For binyrebarkinsuffisiens er følgende legemidler innført i Nye Metoder² (ID2022_086, 20.06.2022):

- Alkindi: Substitusjonsbehandling av binyrebarkinsuffisiens hos spedbarn, barn og ungdom (fra fødsel til < 18 år).
- Plenadren: Behandling av binyrebarkinsuffisiens hos voksne.

Pristilbud

Immedica har 28.07.2026 bekreftet at følgende pris skal ligge til grunn for beslutning:

¹ [Efmody, INN-hydrocortisone](#)

² [Hydrokortison \(Alkindi, Plenadren\) - Nye metoder](#)



Varenummer	Pakning	Maksimal AUP inkl. mva.	RHF-AUP inkl. mva.
453609	5 mg, 50 kapsel	1 995,90 NOK	
071082	10 mg, 50 kapsel	3 934,50 NOK	

I SPC beskrives dosering for Efmody slik:

Anbefalte substitusjonsdoser med hydrokortison er 10-15 mg/m²/dag (CAH) og 8-10 mg/m²/dag (andre former for binyrebarkinsuffisiens) hos ungdom i alderen 12 år og eldre som ikke har sluttet å vokse, 15-25 mg/dag hos ungdom som har sluttet å vokse, og hos voksne pasienter med binyrebarkinsuffisiens eller CAH. Hos pasienter med noe gjenværende endogen kortisolproduksjon kan en lavere dose være tilstrekkelig.

Basert på dosering 15-25 mg/dag, tilsvarer dette en årskostnad på [REDACTED] med tilbudt RHF-AUP og 43 292 – 72 014 NOK med maksimal AUP. Månedskostnaden for Efmody er [REDACTED] RHF-AUP.

Kostnadseffektivitet

Det er ikke beregnet kostnadseffektivitet ved bruk av hydrokortison til aktuell indikasjon. Plenadren og Alkindi har tidligere blitt besluttet innført av Nye Metoder for behandling av binyrebarkinsuffisiens. Det ble ikke utført en metodevurdering.

Plenadren har indikasjon for behandling av binyrebarkinsuffisiens for voksne. Basert på vedlikeholdsdose beskrevet i SPC på 20–30 mg/dag er årskostnad for behandling med Plenadren, [REDACTED] basert på RHF-AUP. For en dose på 25 mg/dag er årskostnaden [REDACTED] RHF AUP.

Alkindi har indikasjon for behandling av binyrebarkinsuffisiens for spedbarn, barn og ungdom. Basert på dosering beskrevet i SPC på 8–10 mg/m²/døgn er årskostnad for behandling med Alkindi for en pasient på 12-13 år om lag [REDACTED] RHF AUP.

Budsjettkonsekvenser

Det er ikke beregnet budsjettkonsekvenser for innføring av aktuell indikasjon.

Det er usikkert hvor mange pasienter som kan være aktuelle for metoden. Leverandør viser i anmodningen til årsrapporten fra 2024 av norsk kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS). Prevalensen av binyrebarksvikter er beskrevet å være 50 per 100 000 i Norge. Ifølge leverandør var det 890 levende med binyrebarksvikt i 2024. I 2024 sto 26 % av pasientene i registeret på behandling med Plenadren.

Betydning for fremtidig anskaffelse

Dersom Efmody blir besluttet innført på møte i Beslutningsforum 21.09.2026, kan legemiddelet tas i bruk til aktuell indikasjon fra beslutningstidspunktet.

Informasjon om refusjon av hydrokortison (Efmody) i andre land

Sverige: Ingen relevant informasjon identifisert

Danmark: Ingen relevant informasjon identifisert

Skottland (SMC): Ingen relevant informasjon identifisert



England (NICE/NHS): Ingen relevant informasjon identifisert

Oppsummering

Sykehusinnkjøp har beregnet legemiddelkostnader for behandling med Efmody. Årskostnad for behandling med Efmody er [REDACTED] med tilbudt RHF-AUP. [REDACTED]

Dersom hydrokortison (Efmody) blir besluttet innført til behandling av binyrebarkinsuffisiens hos ungdom ≥ 12 år og voksne på møte i Beslutningsforum 21.09.2026, kan legemiddelet tas i bruk til aktuell indikasjon fra beslutningstidspunktet.

Christina Sivertsen
Fagsjef

Hana Mikami Salyga
Fagrådgiver

Prosess		
Sykehusinnkjøp mottatt underlag til forhandlingene fra DMP	n.a.	Oppdrag bestilt i Bestillerforum: 15.06.2026
Henvendelse til leverandør om prisopplysninger	23.06.2026	
Fullstendige opplysninger (pris og preparatomtale) fra leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF	28.07.2026	
Aktuell indikasjon godkjent	13.03.2026	Kommisjonsvedtak
Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF	04.08.2026	
Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF	50 dager hvorav 35 dager i påvente av prisopplysninger fra legemiddelfirma. Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp på 15 dager.	